



ไข้กาฬหลัง||่อน

Meningococcal Meningitis




สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไข้กาฬหลังແວນ

Meningococcal Meningitis

โรคไข้กาฬหลังແວນ เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ นิสซีเรีย มินิงใจติดส มีรายงานพบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยในเขตตอนอุ่น และเขตร้อน คนทุกกลุ่มอายุเป็นโรคนี้ได สำหรับประเทศไทยมักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พบรากในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอย่างแออัด และอาจถ่ายเทไม่สะดวก



● โรคแพร่ติดต่อได้อย่างไร

การติดต่อเกิดขึ้นโดยการคลุกเคลือกลัชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ (ผู้ที่มีเชื้อในช่องปากและจมูก แต่ไม่แสดงอาการ) โดยเชื้ออยู่ในละอองน้ำมูก น้ำลาย เมือผู้ป่วยหรือผู้เป็นพาหะ ไอ หรือจาม ก็จะสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได



● โรคนี้มีระยะเวลาตัวบวมก่อนที่จะหาย

ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งเริ่มปรากฏอาการป่วยของโรคนี้ (ระยะฟักตัวของโรค) มักอยู่ในช่วง 2-10 วัน

● ผู้ป่วยจะแสดงอาการอะไรบ้าง

อาการเริ่มตัวมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะมาก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บคอ ปวดข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่ขา และหลัง ต่อมอาจจะเลือดออกใต้ผิวนังเป็นจุดแดงขึ้นตามตัว แขน ขา แล้วกลایเป็นจ้ำเลือด สีคล้ำ และสะเก็ดดำในที่สุด ผู้ป่วยมักมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คือ มีอาการคอดเข็งร่วมด้วย ในรายที่เป็นรุนแรง ผู้ป่วยจะซึมชัก ช็อก และอาจเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการ




● มีวิธีรักษาโรคอย่างไร

เมื่อมีอาการป่วยลงลัยเป็นโรคนี้ ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที ซึ่งแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิผลดี ต่อการรักษาโรคนี้

● จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคได้อย่างไร

โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวให้แข็งแรงสมบูรณ์ ดังนี้


- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือผู้เป็นพาหะ
- ไม่ใช้แก้วน้ำ ช้อน ฯลฯ ร่วมกับผู้อื่น ควรใช้ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
- ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะภายหลังสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย



- ไม่ควรเข้าไปอยู่ในที่แออัด ผู้คนหนาแน่น อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้มีโอกาสสรับเชื้อจากผู้ที่เป็นพาหะได้ง่าย



- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย สม่ำเสมอ



- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยง บุหรี่ สุรา ฯลฯ
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการ ทำงานหักโหมติดต่อกันเป็นเวลานาน และ หลีกเลี่ยงความเครียด ซึ่งจะทำให้ร่างกาย อ่อนแคร และภูมิคุ้มกันทางโรคต่ำ

● มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไป ต่างประเทศอย่างไรบ้าง

ผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคชุก เช่น บางประเทศ ในแถบอาฟริกากลาง และผู้ที่จะไปอยู่ในที่คนมาอยู่ รวมกันอย่างแออัด ควรปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีน ป้องกันก่อนเดินทาง



ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ และอุमเราะห์ที่ ประเทศไทยอุติอาะเบีย ต้องได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นทุกคน ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยออกกฎหมายให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้อง¹
แสดงเอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 2 ปี ก่อนออกเดินทาง

● สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับ² การฉีดวัคซีนได้ที่ด้านบัง

กรุงเทพมหานคร

- สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-3430
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
บริเวณกองตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2286-5114
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมือง
โทร. 0-2535-1482
- ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
ท่าเรือคลองเตย
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2249-4110



ต่างจังหวัด

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 แห่ง ในภาคใต้



ติดต่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-3167