



การดูแลผู้ป่วยหัวใจโรค

1. ให้ดื่มน้ำและน้ำตาลเกลือแร่

โอลาร์ เอส (สูตรขององค์การเภสัชกรรม หรือองค์กรอนามัยโลก) โดยให้ดื่มปริมาณเท่ากับปริมาณอุจจาระที่ถ่ายออกมาก่อนครั้ง เพื่อป้องกันการขาดน้ำและเกลือแร่ ดังนี้



- อายุน้อยกว่า 2 ปี ให้ดื่มครั้งละ $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ แก้ว โดยใช้ข้อนคู่ๆๆ ป้อน 1 ข้อนชาทุก 1-2 นาที ไม่ต้องอดอาหาร หรือน้ำเครื่องให้อาหารเหลวบ่อยครั้ง เช่น น้ำข้าวต้ม น้ำแกงจืด รวมทั้งนมแม่ สำหรับเด็กที่มีน้ำผลาญให้ผสมเหมือนเดิมแต่ปริมาณลดลง และให้สลับกับสารและน้ำตาลเกลือแร่

- อายุมากกว่า 2 ปี ให้ดื่ม $\frac{1}{2}$ - 1 แก้ว โดยดื่มทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เมื่ออาการดีขึ้น ให้หยุดดื่มน้ำและน้ำตาลเกลือแร่ และรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย ได้แก่ โจ๊ก ข้าวต้ม จะช่วยให้เด็กได้สารอาหาร และฟันตัวได้เร็วขึ้น

2. ให้ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระในสัมทนูกลุ่มขณะ และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งหลังขับถ่าย



3. กำจัดอาเจียนของผู้ป่วย โดยเททิ้งลงในสัมทนาก่อนให้สะอาดแล้วใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำผักสมوضักษ์ฟอกกระดช่า


4. รักษาความสะอาดของสิ่งของ เครื่องใช้ของผู้ป่วยรวมทั้งชักเตี้ยวผ้าให้สะอาด และนำไปตากแดด



5. ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วย ให้หมั่นล้างมือ พอกสูญให้สะอาดอยู่เสมอ

6. หากดื่มน้ำและน้ำตาลเกลือแร่ไปแล้วภายใน 8-12 ชั่วโมง หรือทำการดูแลที่บ้าน แล้วอาการไม่ดีขึ้น เช่น ยังคงถ่ายเป็นน้ำจำนวนมาก อาเจียนบ่อย รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้ กระหายน้ำมากกว่าปกติ อ่อนเพลียมาก ตาโหลลึกให้รีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน

หัวใจโรค



สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค
02-590-3183

DDC
1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

กินสุข ร้อน สะอาด ปราศจากหัวใจโรค



อาการ

อาการมีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงรุนแรง

ผู้ที่ไม่มีอาการ เป็นแหล่งสะสมและแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น เรียกว่าเป็น พาหะ

ผู้ที่มีอาการอย่างอ่อน จะปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลว วันละหลายครั้ง อาการคล้ายโรคอุจจาระร่วงหรือท้องร่วง อาจหายเป็นปกติภายใน 1-2 วัน

ผู้ที่มีอาการรุนแรง จะถ่ายอุจจาระเป็นน้ำสีขุ่น คล้ายน้ำชาข้าว กลิ่นเหม็นคาวจัด อาจมีอาเจียน

ถ้าไม่รักษา การถ่ายบ่อยจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ และเกลือแร่ เกิดอาการอ่อนเพลีย ปากแห้ง กระหายน้ำ กระสับกระส่าย ตาลีกโหล ซึ่งจะเต้นเบาและเสียชีวิตได้

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ วิบริโอ คอเลอเร (Vibrio Cholerae) ที่อยู่ในอุจจาระ อาเจียนของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ แล้วแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม บนเปลือกในอาหารและน้ำดื่ม โดยมีของผู้ป่วย ผู้สัมผัส รวมทั้งมีแมลงวันเป็นพาหะนำโรค ระยะเวลา 1-5 วัน (เฉลี่ยประมาณ 1-2 วัน)



การป้องกัน

1. **รับประทานอาหารที่สะอาด** ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม สำหรับอาหารค้างเมื่อ ควรอุ่นให้ร้อนจัดก่อนรับประทาน ทุกครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารดิบ หรือดิบๆ สุกๆ โดยเฉพาะอาหารทะเล เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ ต้องล้างให้สะอาด ก่อนปรุงทุกครั้ง และทำให้สุกก่อนรับประทาน



2. **ล้างผักสด ผลไม้** ให้สะอาดก่อนรับประทาน

3. **ดื่มน้ำสะอาด** เช่น น้ำดั้มสุก น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน และเลือกน้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัยรับประทาน

4. **ภาชนะที่ใช้ในการกินและดื่มต้องสะอาด** และเก็บไว้ในที่ มิดชิดป้องกันแมลง หนู จิงจก ໄต่ตอม

5. **ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาด** ก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนใช้มือหยิบอาหารป้อนเด็ก และหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมทุกครั้ง



6. **ใช้ฝาปิดอาหาร** หรือใส่ตู้กับข้าวหรือตู้เย็นป้องกันแมลงวันตอมอาหาร และต้องอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน

7. **ถ่ายอุจจาระในห้องส้วมที่ถูกสุขาณณะ**

8. **ถังขยะควรมีฝาปิด** และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน